Les Leucémies Aigues Myéloïdes

Dr GILIS Lila

- Hématologie
- UE 2.9 S5

OBJECTIF

- Connaitre la définition des leucémies aiguës myéloïdes
- Connaitre les différents types de présentation clinique au diagnostic
- Pouvoir expliquer au patient le rôle et le déroulement du bilan médullaire
- Connaitre les urgences au moment du diagnostic
- Connaitre les principes du traitement et ses complications

PLAN

- Connaissances antérieures : l'hématopoïèse
- Définition
- Epidémiologie et facteurs favorisants
- Présentation clinique au diagnostic
- Hémogramme au diagnostic
- Exploration de la moelle osseuse : la ponction médullaire
- Bilan diagnostique
- Urgences au diagnostic
- Bilan pré-thérapeutique
- Traitement
- A retenir

CONNAISSANCES ANTERIEURES

- Hématopoïèse : ensemble des mécanismes qui assurent le renouvellement des cellules sanguines et l'adaptation permanente aux besoins
- Lieu : moelle osseuse rouge des os courts et plats : sternum, côtes, vertèbres et os iliaques

DÉFINITION

- **Définition : Prolifération maligne monoclonale d'une cellule anormale à partir d'un précurseur hématopoïétique (le BLASTE) avec blocage de la maturation**

ÉPIDÉMIOLOGIE

- Epidémiologie : pathologie du sujet âgé
- Âge médian : entre 64 et 70ans
- Incidence : 5 / 100 000 à 60 ans
17 / 100 000 à 80 ans

Juliusson et al. *Blood*, 2012

- Facteurs étiologiques :
 - Traitements par chimiothérapie, radiothérapie
 - Expositions professionnelles : agents chimiques (benzène...), radiations ionisantes...
 - ATCD hématologiques (syndromes myéloprolifératifs et myélodysplasiques)
 - Facteurs génétiques (trisomie 21, maladie de Fanconi...)
- Mais dans la majorité des cas, aucune cause n'est retrouvée.

PRÉSENTATION CLINIQUE AU DIAGNOSTIC

- Signes généraux :
 - AEG, fièvre, sueurs nocturnes

- Manifestations tumorales :
 - Atteinte cutanée : leucémides
 - Manifestations neuro-méningées
 - Hypertrophie gingivale
 - Adénomégalie, splénomégalie

- Insuffisance médullaire :
 - Syndrome anémique
 - Syndrome hémorragique
 - Syndrome infectieux

HEMOGRAMME (NFP) au diagnostic

RAPPEL NFP NORMALE

Hémoglobine : 120 à 160g/l (F) et
130 à 170g/l (H)

- < anémie
- > polyglobulie

Plaquettes : 150 à 400 G/l

- < thrombopénie
- > thrombocytose

Leucocytes : 4 à 10 G/l

- < leucopénie
- > hyperleucocytose

PNN : 1.5 G/l à 7 G/l

- < neutropénie
- > polynucléose neutrophile

Lymphocytes : 1.5 G/l à 4 G/l

- < lymphopénie
- > lymphocytose

CAS N°1

Hb : 102 g/l

→ anémie

Plaquettes : 85 G/l

→ thrombopénie

Leucocytes : 38 G/l

→ hyperleucocytose

PNN : 6 G/l

Lymphocytes : 5 G/l

Blastes : 67%

→ présence de blastes
circulants

CAS N°2

Hb : 101 g/l

→ anémie

Plaquettes : 10 G/l

→ thrombopénie

Leucocytes : 1.14 G/l

→ leucopénie

PNN : 0,14 G/l

→ neutropénie

Lymphocytes : 1 G/l

→ pas de blastes
circulants

EXPLORATION DE LA MOELLE OSSEUSE : LA PONCTION MEDULLAIRE

- Indications :

- Anomalie quantitative de la NFS
- Anomalie qualitative de la NFS = présence de cellules anormales

- Prélèvement :

- Désinfection cutanée
- Anesthésie locale
- Ponction et aspiration
- Frottis
- Séchage

Au lit du patient

BILAN DIAGNOSTIQUE : BILAN MEDULLAIRE

1. Étude cytologique = myélogramme → classification morphologique FAB

Myélogramme normal : tous les précurseurs hématopoïétiques sont représentés à différents stades de maturation

Leucémie aigue : prolifération de précurseurs hématopoïétiques anormaux avec blocage de maturation

2. Étude immunologique ou immunophénotypage = marqueurs de surface
3. Étude cytogénétique = anomalies des chromosomes
4. Étude biologie moléculaire = anomalies de l'ADN

URGENCES AU DIAGNOSTIC

1. Aplasie fébrile
2. Syndrome de lyse tumorale
3. Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
4. Leucostase pulmonaire ou neurologique

→ Hospitalisation en urgence en hématologie

URGENCES AU DIAGNOSTIC

1. Aplasie fébrile

- Très fréquente
- Infection pulmonaire ++
- Risque d'évolution vers le choc septique

→ **Antibiothérapie en urgence**

- Autres symptômes d'insuffisance médullaire :

- Douleur thoracique
- Hémorragie

→ **Transfusions en urgence**

URGENCES AU DIAGNOSTIC

2. Syndrome de lyse tumorale

- Facteurs de risque :
 - Temps de doublement rapide
 - Forte masse tumorale / hyperleucocytose
 - Mise en route de la chimiothérapie +++
- Diagnostic : ionogramme
 - Hyperuricémie, hyperkaliémie, acidose métabolique
 - Insuffisance rénale aiguë
 - LDH augmentées
- Traitement :
 - Hyperhydratation
 - Hypo-uricémiants, hypokaliémiants

URGENCES AU DIAGNOSTIC

3. CIVD

- Physiopathologie :
 - dépôts de fibrine entraînant la défaillance de nombreux organes par thrombose
 - consommation des plaquettes et des facteurs de la coagulation à l'origine d'un sd hémorragique
- Diagnostic : NFP et bilan de coagulation
 - D-dimères augmentés : témoin direct de la formation excessive de thrombine et de fibrine
 - Plaquettes diminuées : témoin de la consommation excessive de plaquettes
 - TP et fibrinogène abaissés : témoins de la consommation excessive des facteurs de la coagulation
- Traitement :
 - Transfusions (plaquettes, plasma frais congelé)

→ **Chimiothérapie en urgence**

URGENCES AU DIAGNOSTIC

4. Leucostase

- Accumulation de blastes dans les microvaisseaux
- Organes:
 - Poumons : Pneumopathie hypoxémiante
 - Cerveau : Troubles de la conscience

BILAN PRETHERAPEUTIQUE

- Avant la chimiothérapie :
 - ECG / Echographie cardiaque
 - Pose de voie veineuse centrale
- Bilan pré-transfusionnel
 - Groupage sanguin, rhésus
 - Sérologies virales
- En cas d'allogreffe
 - Groupage HLA
- Pour préserver la fertilité
 - CECOS

TRAITEMENT

1. Sujets jeunes < 65 ans : prise en charge à visée curative

- Traitement d'induction = chimiothérapie intensive
 - Anthracycline + Aracytine
- Traitements de consolidation
 - *Soit* Chimiothérapie intensive
 - 2-3 cycles
 - fortes doses d'aracytine
 - *Soit* Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

2. Sujets âgés > 65 ans : prise en charge à visée non curative

- Chimiothérapie palliative Soins de supports (transfusions, antibiotiques...)

→ Survie sans traitement : de quelques jours à quelques mois

CHIMIOThERAPIE INTENSIVE

La rémission complète se définit par $< 5\%$ de blastes dans la moelle osseuse
Elle n'est pas synonyme de guérison.
On peut parler de guérison après 5 ans de rémission complète

COMPLICATIONS DE LA CHIMIOThERAPIE

Alopécie

Problèmes digestifs

vérifier l'absence de grossesse

Aplasie médullaire

Nausées vomissements

Anorexie

A RETENIR

- Une maladie rare qui touche principalement les sujets âgés
- Un risque vital au diagnostic nécessitant de débiter le traitement en urgence
- Une maladie curable chez les sujets jeunes avec des chimiothérapies intensives et une hospitalisation prolongée
- Recours possible à l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
- Pas de possibilité curative pour les patients les plus âgés

Université Claude Bernard Lyon 1

Réalisation technique : **Service ICAP - Université Claude Bernard Lyon 1**
Soutien financier : **Région Rhône-Alpes** dans le cadre de **l'UNR-RA**

Des questions